

第4章 ダイオキシン類調査結果

県下のダイオキシン汚染の実態を把握するため、平成10年度から大気の調査を行ってきた。

平成20年度は、県下5市の計5地点を対象に、大気環境中のダイオキシン類の調査を行った。

〈調査地点・期間〉

調査地点：別府市、日田市、竹田市、中津市、佐伯市の計5地点

調査期間：平成20年7月、平成21年1月



番号	地域区分	調査地点	
①	一般環境	東部保健所	(別府市)
②		西部保健所	(日田市)
③		豊肥振興局(旧竹田保健所)	(竹田市)
④		北部振興局中津事務所	(中津市)
⑤		佐伯市役所第二庁舎	(佐伯市)

〈調査方法〉

ハイボリュームエアサンプラーによりフィルター及びウレタンに捕集し、高分解能ガスクロマトグラフ質量分析装置により分析を行う。

毒性等量の算定は、WTO-TEF(2006年)による(検出下限値以上定量下限値未満はそのままの値を、検出下限値未満は検出下限値の1/2を用いて毒性等量を算出)。

〈調査結果〉

各調査地点ごとの調査結果を表4-1に示す。

各地点の測定値は0.0099~0.049pg-TEQ/m³の範囲内にあり、全調査地点とも環境基準値の0.6pg-TEQ/m³を下回っており、環境基準に適合している。

表4-1 ダイオキシン類調査結果

調査地点名		試料採取年月	測定濃度	地点別平均濃度	環境基準	備考
一般環境	① 東部保健所	20年 7月	0.018	0.015	0.6	(地点別平均の平均値) 平成19年度 0.015 平成20年度 0.019
		21年 1月	0.011			
	② 西部保健所	20年 7月	0.013	0.011		
		21年 1月	0.0099			
	③ 豊肥振興局	20年 7月	0.022	0.021		
		21年 1月	0.02			
	④ 北部振興局 中津事務所	20年 7月	0.011	0.014		
		21年 1月	0.016			
	⑤ 佐伯市役所第 二庁舎	20年 7月	0.016	0.033		
		21年 1月	0.049			

- ・測定結果は、ホリ塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシン、ホリ塩化ジベンゾフラン及びコプラナーホリ塩化ビフェニル(コプラナーPCB)の合計値である。
- ・pg-TEQ/m³は、空気1m³当たりのダイオキシン類の量を示す。
- ・pgは1兆分の1グラム。TEQは毒性等量で、ダイオキシン類には222種類(異性体)があり、毒性は異性体ごとに異なるため、測定対象の29物質の濃度を最も毒性の強い2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-パラ-ジオキシンの濃度を換算し、合計したものである。