

残った雑草には**中後期除草剤**を使いましょう！

↓ 中後期除草剤のラインナップです！

粒・ジャンボ剤	10a当たりの使用量	散布時における田水面の状態	イネ科雑草	広葉雑草	備考
クリンチャーIキロ粒剤	1～1.5kg	湛水	○	×	ノビエ防除に効果的
クリンチャージャンボ	20～30パック				
バサグラン粒剤	3～4 kg	落水	×	○	難防除雑草にも高い効果
レブラスIキロ粒剤	1 kg	湛水	○	○	ドローン散布用の「エアー粒剤」もあります
レブラスジャンボ	10パック				

粒・ジャンボ剤	10a当たりの使用量 (希釈水量)	散布時における田水面の状態	イネ科雑草	広葉雑草	備考
バサグラン液剤	500～700ml (70～100L)	落水	×	○	難防除雑草にも高い効果
ワイドアタックSC	100ml (100L)	落水	○	○	I成分で幅広く防除

※備考は農薬メーカーHPを参考に記載
難防除雑草・・・クログワイ・オモダカ・シズイ等

除草剤の使用方法は守りましょう！
(詳しくは**先月号**をチェックです！)



中干しの時期が遅くなっていませんか？

<時期>

- ・田植後**40～50日**程度、1株が**茎数20本**程度

<中干しの目安>

- ・中干し実施は**7日～10日間**程度
- ・田面の**ヒビが約1cm**入る程度に干す



<中干しの効果>

- ・根の発育促進による**収量増加**や**倒伏防止**
- ・収穫時の**機械作業**がスムーズに！

