


病害虫は **出穂期前後** が基幹防除の時期！

〈いもち病（葉いもち）〉

- ・ 葉に**ひし形**の病徴が発生
- ・ 初発時期の薬剤防除が有効
- ・ **穂いもち**の原因となり、品質低下や減収につながる



葉いもち



穂いもち



↑ 県内の葉いもち発生予測は**BLASTAM**で確認！
好適条件(●)の1週間後が増加注意！！

〈カメムシ類〉

- ・ **斑点米**の原因
- ・ 畦畔の草刈は**出穂2週間前**までに行う



〈ウンカ類〉

- ・ **坪枯れ**やくず米の原因
- ・ 水管理の際は、発生していないか**株元**をこまめに確認する



← 病害虫発生に関する情報は

県が発表する**注意報・警報**をチェックです！

〈基幹防除の例〉：2度の防除が基本！

液剤体系

1回目：穂ばらみ期
〈例〉ビームエイトEXゾル
(いもち、ウンカ、カメムシ等に効果的)



2回目：穂揃期
〈例〉ブレードスタークルRゾル
(いもち、ウンカ、カメムシ等に効果的)

粒剤使用の場合

1回目：出穂期2週間前
〈例〉コラトップスタークル1キロ粒剤
(いもち、ウンカ、カメムシ等に効果的)



2回目：穂揃期
〈例〉ヘリ防除に業務を委託する

- ・ 病害虫の**多発生時**には、適正な農薬の**追加散布**が重要です！
- ・ 散布時は**ラベル**を確認して、使用量や時期、回数などに注意です！

月に1回、**水稻勉強会**を開催しています！！

- ・ 次回は8月7日(木)16時～
- ・ 場所：片ヶ瀬集会所（竹田市片ヶ瀬585-1）
- ・ 内容：**獣害対策**（効果的な電気柵の設置について）
- ・ ご参加は豊肥振興局 集水2班（63-1301）

または**公式LINE**からご連絡下さい！

水稻勉強会公式LINE（各地区ごと）



萩地区



直入地区



竹田地区



久住地区



豊肥振興局HP
からカラーで見
れます！

大分県農業協同組合豊肥営農経済センター 営農部 農産課 63-4994
大分県豊肥振興局生産流通部 集落営農・水田畑地化第二班 63-1301