

3. 移植水稻

(1)初期剤(体系処理の前処理剤)

薬 剤 名 (毒性)	成分名	含有%	留意事項
サキドリ1キロ粒剤(普)	ブタクロール	5	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、コウキヤガラ(体系処理) ②SU抵抗性雑草にも有効 ③移植前処理は、植代(処理日)～移植まで7日以上ある場合に使用する。
	ペントキサゾン	1.5	
サキドリEW(普)	ブタクロール	12	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ミズガヤツリ、クログワイ(体系処理)、コウキヤガラ(体系処理) ②SU抵抗性雑草にも有効 ③移植前処理は、植代(処理日)～移植まで7日以上ある場合に使用する
	ペントキサゾン	4	
シング乳剤(普)	ピリブチカルブ	12	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ ②深水で葉鞘褐変、流れ葉が出ることがある。 ③移植前処理は、植代(処理日)～移植まで7日以上ある場合に使用する
	ブレチラクロール	8	
デルカット乳剤(普)	オキサジアゾン	8	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミズガヤツリ、クログワイ(体系処理) ②植代時に原液のまま散布し混和する。または、植代直後原液のまま散布し、ただちに整地版で均平作業を行う ③250～350mlの稜々散布は移植後に使用する除草剤との体系で使用する
	ブタクロール	12	
ベクサーフロアブル(普)	ペントキサゾン	2.9	①1年生雑草及びマツハイ ②深水条件で葉鞘褐変、流れ葉が出ることがあるので、水管理に注意する ③SU抵抗性雑草にも有効 ④移植前処理は、植代(処理日)～移植まで7日以上ある場合に使用する
メテオ1キロ粒剤(普)	ペントキサゾン	2.5	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ ②移植前処理は、植代(処理日)～移植まで7日以上ある場合に使用する。 ③SU抵抗性雑草にも有効
メテオジャンボ(普)	ペントキサゾン	8.3	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ ②SU抵抗性雑草にも有効
メテオフロアブル(普)	ペントキサゾン	5	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ ②移植前処理は、植代(処理日)～移植まで7日以上ある場合に使用する。 ③SU抵抗性雑草にも有効

(2)初中期一発剤

薬 剤 名(毒性)			留意事項
アクシズMXジャンボ(普)/ウツベシMXジャンボ(普) 【他の剤型】 1キロ粒剤、エアー粒剤	ピリフタリド	8.0	①1年生雑草及び多年生広葉雑草 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能 ④直播水稻にも使用可能
	メソトリオン	3.0	
	メタゾスフロン	2.7	
アシュラ1キロ粒剤(普)	トリアファモン	0.5	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、ヘラオモダ'カ、オモダ'カ、クログ'ワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草・アオミ'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	ピラクロニル	2	
	ベンゾビシクロン	2	
アシュラジャンボ(普)	トリアファモン	1.25	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、ヘラオモダ'カ、オモダ'カ、クログ'ワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草・アオミ'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピラクロニル	5	
	ベンゾビシクロン	5	
アシュラ400FG(普)	トリアファモン	1.25	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、ヘラオモダ'カ、オモダ'カ、クログ'ワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草・アオミ'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	ピラクロニル	5	
	ベンゾビシクロン	5	
アシュラフロアブル(普)	トリアファモン	0.96	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、ヘラオモダ'カ、オモダ'カ、クログ'ワイ、コウキヤガラ、多年生イネ科雑草・アオミ'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	ピラクロニル	3.8	
	ベンゾビシクロン	3.8	
アピログロウMXジャンボ(普)	ピラゾスフロンエチル	0.75	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ、アオミ'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピリフタリド	3.75	
	プレチラクロール	11.25	
	メソトリオン	2.25	
イッセンジャンボ(普)	ピリミスルファン	3	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ
	フェントラザミド	12	
	プロモブチド	36	
イッセン豆つぶ250(普)	ピリミスルファン	3	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミ'ロ・藻類による表層はく離
	フェントラザミド	12	
	プロモブチド	36	
イッセン1キロ粒剤(普)	ピリミスルファン	0.75	①1年生雑草及びホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミ'ロ・藻類による表層はく離
	フェントラザミド	3	
	プロモブチド	9	
イッポンD1キロ粒剤51(普)	ダイムロン	4	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ウリカワ、ミズ'カ'ヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ、コウキヤガラ、アオミ'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	ピラクロニル	2	
	プロモブチド	6	
	ベンスルフロンメチル	0.51	
イッポンDジャンボ(普)	ダイムロン	8	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピラクロニル	4	
	プロモブチド	12	
	ベンスルフロンメチル	1	
イッポンDフロアブル(普)	ダイムロン	8	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ、コウキヤガラ、アオミ'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリ散布可
	ピラクロニル	4	
	プロモブチド	12	
	ベンスルフロンメチル	1	
イネキング1キロ粒剤(普)	ピラクロニル	2	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、オモダ'カ、クログ'ワイ、アオミ'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効で残効性長い ③無人ヘリ散布可
	ピラゾレート	10	
	ベンゾビシクロン	2	
イネキングジャンボ(普)	ピラクロニル	4	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、オモダ'カ、クログ'ワイ、アオミ'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピラゾレート	20	
	ベンゾビシクロン	4	
イネキングフロアブル(普)	ピラクロニル	3.6	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	ピラゾレート	20	
	ベンゾビシクロン	4	
イネリーグ1キロ粒剤(普)	クロメブロップ	4.5	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロカ、オモダ'カ、クログ'ワイ、セリ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	テフリルトリオン	3.0	
	フェントラザミド	3.0	
イネリーグジャンボ(普)	クロメブロップ	11.2	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロカ、オモダ'カ、クログ'ワイ、セリ ②SU抵抗性雑草にも有効
	テフリルトリオン	7.5	
	フェントラザミド	7.5	
イネリーグフロアブル(普)	クロメブロップ	8.5	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロカ、オモダ'カ、クログ'ワイ、セリ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	テフリルトリオン	5.7	
	フェントラザミド	5.7	
イノーバDX1キロ粒剤51(普)	ダイムロン	4.5	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヘラオモダ'カ、ヒルムシロ、オモダ'カ、セリ、クログ'ワイ、アオミ'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	フェントラザミド	2	
	プロモブチド	7.5	
	ベンスルフロンメチル	0.51	

イノーバDXアップ1キロ粒剤51(普)	ダイムロン	4.5	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、オモダ'カ、セリ、クログ'ワイ、アオミト'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	フェントラザミド	3	
	プロモブチド	9	
	ベンスルフロンメチル	0.51	
ウィニングランジャンボ(普)	イプフェンカルバゾン	5	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ミス'ガヤツリ、ウリカワ、オモダ'カ、クログ'ワイ、シズ'イ、ヒルムシロ、セリ、アオミト'ロ・藻類による表層剥離 ②1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ミス'ガヤツリ、ウリカワ、セリ
	プロモブチド	18	
	ベンスルフロンメチル	1.5	
ウィニングランフロアブル(普)	イプフェンカルバゾン	5	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ、コウキヤガラ、アオミト'ロ・藻類による表層はく離 ②アオミト'ロ、表層剥離は発生前まで、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリは2葉期までに処理する ③無人航空機による散布も可能
	プロモブチド	18	
	ベンスルフロンメチル	1.4	
ウィニングラン1キロ粒剤(普)	イプフェンカルバゾン	2.5	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ、コウキヤガラ、アオミト'ロ・藻類による表層はく離 ②アオミト'ロ、表層剥離は発生前まで、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリは2葉期までに処理する ③無人航空機による散布も可能
	プロモブチド	9	
	ベンスルフロンメチル	0.75	
ウルティモZジャンボ(普)	シクロピリモレート	8.6	①一年生雑草、多年生雑草、エゾ'ノサヤスカグサ、アオミト'ロ・藻類による表層剥離
	ピラゾレート	17.1	
	プロピリスルフロン	2.57	
ウルティモZ1キロ粒剤(普)	シクロピリモレート	3	①一年生雑草、多年生雑草、エゾ'ノサヤスカグサ、アオミト'ロ・藻類による表層剥離
	ピラゾレート	6	
	プロピリスルフロン	0.9	
ウルティモZフロアブル(普)	シクロピリモレート	5.5	①一年生雑草、多年生雑草、エゾ'ノサヤスカグサ、アオミト'ロ・藻類による表層剥離
	ピラゾレート	11	
	プロピリスルフロン	1.65	
エンペラー1キロ粒剤(普)	ピラクロニル	2	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、クログ'ワイ、コウキヤガラ、アオミト'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピリミノバックメチル	0.75	
	フェンキノトリオン	3	
エンペラージャンボ(普)	ピラクロニル	8	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、クログ'ワイ、コウキヤガラ、アオミト'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピリミノバックメチル	3	
	フェンキノトリオン	12	
カウンシルエナジー1キロ粒剤 ／アバンティ1キロ粒剤(普)	トリアファモン	0.5	①一年生及び多年生雑草 ②SU抵抗性雑草にも有効
	フェンキノトリオン	3	
	フェントラザミド	3	
カウンシルエナジージャンボ ／アバンティジャンボ(普)	トリアファモン	1.2	①一年生及び多年生雑草 ②SU抵抗性雑草にも有効
	フェンキノトリオン	7.5	
	フェントラザミド	7.5	
カウンシルエナジーフロアブル ／アバンティフロアブル(普)	トリアファモン	0.95	①一年生及び多年生雑草 ②SU抵抗性雑草にも有効
	フェンキノトリオン	5.7	
	フェントラザミド	5.7	
キマリテ1キロ粒剤(普)	イプフェンカルバゾン	2.5	①水田一年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	テフリルトリオン	3.0	
キマリテジャンボ(普)	イプフェンカルバゾン	8.3	①水田一年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ ②SU抵抗性雑草にも有効
	テフリルトリオン	10	
キマリテフロアブル(普)	イプフェンカルバゾン	5.0	①水田一年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ、アオミト'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	テフリルトリオン	6.0	
銀河1キロ粒剤(普)	ダイムロン	10	①水田一年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピラクロニル	2	
	メダゾスルフロン	1	
銀河ジャンボ(普)	ダイムロン	25	①水田一年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	ピラクロニル	5	
	メタゾスルフロン	2.5	
銀河フロアブル(普)	ダイムロン	20	①水田一年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピラクロニル	4	
	メダゾスルフロン	2	
クサトリーDX1キロ粒剤51(普)	フェントラザミド	3	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミト'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	プロモブチド	6	
	ベンスルフロンメチル	0.51	
クサトリーDXジャンボL(普)	フェントラザミド	7.5	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミト'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	プロモブチド	15	
	ベンスルフロンメチル	1.27	
クサトリエースLジャンボ(普)	カフェンストロール	7	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ、コウキヤガラ、アオミト'ロ・藻類による表層はく離
	ダイムロン	15	
	ベンスルフロンメチル	1.7	
クサトリエース粒剤17(普)	カフェンストロール	1	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミト'ロ・藻類による表層はく離
	ダイムロン	2	
	ベンスルフロンメチル	0.17	
クサホーブD粒剤(普)	ジメタメトリン	0.2	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダ'カ、ミス'ガヤツリ、オモダ'カ、ヒルムシロ、アオミト'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピラゾレート	6	
	プレチラクロール	1.5	
ゴエモン1キロ粒剤(普)	イプフェンカルバゾン	2.5	①水田一年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	イマゾスルフロン	0.9	
	プロモブチド	9	
ゴエモンジャンボ(普)	イプフェンカルバゾン	8.33	①水田一年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ ②SU抵抗性雑草にも有効
	イマゾスルフロン	3	
	プロモブチド	30	

ゴエモンフロアブル(普)	イブフェンカルバゾン	4.6	①水田一年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ ②SU抵抗性雑草にも有効
	イマゾスルフロン	1.7	
	プロモブチド	16.7	
コメット1キロ粒剤(普)	テフリルトリオン	2	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	ピラクロニル	2	
	メタゾスルフロン	0.6	
コメット顆粒(普)	テフリルトリオン	25	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	ピラクロニル	25	
	メタゾスルフロン	7.5	
コメットジャンボ(普)	テフリルトリオン	6.7	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピラクロニル	6.6	
	メタゾスルフロン	2	
コメットフロアブル(普)	テフリルトリオン	4	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピラクロニル	4	
	メタゾスルフロン	1.2	
サキガケ楽粒(普)	イブフェンカルバゾン	10	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダ'カ、ミズ'ガヤツリ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、クログ'ワイ ②無人航空機による散布も可能
	テフリルトリオン	12	
	フロルピラウキシフェンベンジル	2	
サラブレッドKAI1キロ粒剤(普)	イマゾスルフロン	0.9	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	オキサジクロメホン	0.4	
	ピラクロニル	2	
サラブレッドKAIジャンボ(普)	イマゾスルフロン	2.25	①1年生雑草及、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ ②SU抵抗性雑草にも有効
	オキサジクロメホン	0.75	
	ピラクロニル	5	
サラブレッドKAIフロアブル(普)	イマゾスルフロン	1.7	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリ散布可
	オキサジクロメホン	0.57	
	ピラクロニル	3.8	
ジャスタ1キロ粒剤(普)	シクロピリモレート	3	①一年生雑草、多年生雑草、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	トリアファモン	0.5	
	ピラゾレート	6	
ジャスタジャンボ(普)	シクロピリモレート	7.5	①一年生及び多年生雑草 ②SU抵抗性雑草にも有効
	トリアファモン	1.2	
	ピラゾレート	15	
ジャスタフロアブル(普)	シクロピリモレート	5.5	①一年生雑草、多年生雑草、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②水口施用又は無人航空機による滴下も可能 ③SU抵抗性雑草にも有効 ④無人航空機による散布も可能
	トリアファモン	0.9	
	ピラゾレート	11	
シリウスエグザ1キロ粒剤(普)	オキサジクロメホン	0.4	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピラクロニル	2	
	ピラゾスルフロンエチル	0.3	
	ベンゾビスクロン	2	
シリウスエグザジャンボ(普)	オキサジクロメホン	1.4	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピラクロニル	6.6	
	ピラゾスルフロンエチル	1	
	ベンゾビスクロン	6.7	
シンゲキジャンボ(普)	フェンキノトリオン	12	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヘラオモダ'カ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ
	フェントラザミド	12	
シンゲキ豆つぶ250(普)	フェンキノトリオン	12	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、ヘラオモダ'カ
	フェントラザミド	12	
シンゲキフロアブル(普)	フェンキノトリオン	5.6	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、オモダ'カ、ヘラオモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離
	フェントラザミド	5.6	
シンゲキ1キロ粒剤(普)	フェンキノトリオン	3	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離
	フェントラザミド	3	
スラッシャ1キロ粒剤(普)	ジメタメトリン	0.6	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	ピラゾレート	12	
	ブレチラクロール	4.5	
	プロモブチド	6	
セイテンジャンボ(普)	オキサジクロメホン	2.4	①1年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ミズ'ガヤツリ、ウリカワ、クログ'ワイ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	ジメタメトリン	2.4	
	フェンキノトリオン	12.0	
	ベンスルフロンメチル	3.0	
セイテン1キロ粒剤(普)	オキサジクロメホン	0.8	①1年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ミズ'ガヤツリ、ウリカワ、クログ'ワイ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	ジメタメトリン	0.6	
	フェンキノトリオン	3.0	
	ベンスルフロンメチル	0.75	
ゼータジャガージャンボ(普)	フェンキノトリオン	15	①1年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ミズ'ガヤツリ、ウリカワ、クログ'ワイ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ウリカワは3葉期まで、クログ'ワイは草丈15cmまで
	プロピリスルフロン	4.5	
	ペントキサゾン	10	
ゼータジャガー1キロ粒剤(普)	フェンキノトリオン	3	①1年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ミズ'ガヤツリ、ウリカワ、クログ'ワイ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ウリカワは3葉期まで、クログ'ワイは草丈15cmまで
	プロピリスルフロン	0.9	
	ペントキサゾン	2	
ゼータジャガーフロアブル(普)	フェンキノトリオン	5.7	①1年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ミズ'ガヤツリ、ウリカワ、クログ'ワイ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ウリカワは3葉期まで、クログ'ワイは草丈15cmまで
	プロピリスルフロン	1.7	
	ペントキサゾン	3.8	
ゼータタイガー1キロ粒剤 ノドラゴンホークZ1キロ粒剤(普)	フェンキノトリオン	2	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クログ'ワイ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリによる散布可
	プロピリスルフロン	9	
	ペントキサゾン	0.9	

ゼータタイガージャンボ ノドラゴンホークZジャンボ(普)	プロピリスルフロン	3	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クロク'ワイ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	プロモブチド	30	
	ペントキサゾン	6.67	
ゼータタイガーフロアブル ノドラゴンホークZフロアブル(普)	プロピリスルフロン	1.7	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クロク'ワイ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリによる散布可
	プロモブチド	16.8	
	ペントキサゾン	3.7	
ゼータハンマー1キロ粒剤(普)	プロピリスルフロン	0.9	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クロク'ワイ、コウキヤガラ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリによる散布可
	ペントキサゾン	2	
ゼータハンマージャンボ(普)	プロピリスルフロン	4.5	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クロク'ワイ、コウキヤガラ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	ペントキサゾン	10	
ゼータハンマーフロアブル(普)	プロピリスルフロン	1.7	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クロク'ワイ、コウキヤガラ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリによる散布可
	ペントキサゾン	3.9	
ゼータプラス1キロ粒剤(普)	フェンキノトリオン	3	①一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾ'ノサヤヌカ'サ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	プロピリスルフロン	0.9	
ゼータプラスジャンボ(普)	フェンキノトリオン	15	①一年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ミズ'ガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	プロピリスルフロン	4.5	
ゼータプラスフロアブル(普)	フェンキノトリオン	5.8	①一年生雑草、多年生広葉雑草、エゾ'ノサヤヌカ'サ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	プロピリスルフロン	1.7	
ディオーレ1キロ粒剤(普)	オキサジクロメホン	0.4	①1年生雑草及び多年生広葉雑草 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリ散布可
	テフリルトリオン	2	
	メタゾスルフロン	1	
ディオーレジャンボ(普)	オキサジクロメホン	1	①1年生雑草及び多年生広葉雑草 ②SU抵抗性雑草にも有効
	テフリルトリオン	5	
	メタゾスルフロン	2.5	
ドリフ1キロ粒剤(普)	エトキシスルフロン	0.17	①一年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ミズ'ガヤツリ、ウリカワ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クロク'ワイ、コウキヤガラ、キシュウズズ'メノヒエ ②SU抵抗性雑草にも有 ③無人航空機による散布も可 ④砂壤土を除く
	クロメブロップ	4.5	
	トリアファモン	0.4	
	フェントラザミド	2	
ノックアウト楽粒(普)	シメトリン	6.0	①1年生雑草及び多年生雑草、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能 ④直播水稻にも可能 ⑤湛水周縁散布のほか、水口施用、無人航空機による散布、水田の畦畔一辺からの散布等ができる
	テフリルトリオン	10.0	
	トリアファモン	2.0	
	ベンフレセート	18.0	
バッチリLX1キロ粒剤(普)	イマゾスルフロン	0.9	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クロク'ワイ、コウキヤガラ、アオミド'ロ・増類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	オキサジクロメホン	0.4	
	ピラクロニル	2	
	プロモブチド	9	
バッチリLXジャンボ(普)	イマゾスルフロン	2.25	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クロク'ワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効
	オキサジクロメホン	0.75	
	ピラクロニル	5	
	プロモブチド	22.5	
バッチリLXフロアブル(普)	イマゾスルフロン	1.7	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ヘラオモダ'カ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クロク'ワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	オキサジクロメホン	0.56	
	ピラクロニル	3.7	
	プロモブチド	16.3	
ブライオリティ1キロ粒剤	トリアファモン	0.5	①水田一年生雑草、マツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヘラオモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クロク'ワイ、コウキヤガラ、キシュウズズ'メノヒエ ②SU抵抗性雑草にも有効
	フェンキノトリオン	3	
ブルゼータ1キロ粒剤(普)	プロピリスルフロン	0.9	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、クロク'ワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	ベンゾビシクロン	2	
ブルゼータジャンボ(普)	プロピリスルフロン	4.5	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クロク'ワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効
	ベンゾビシクロン	10	
ブルゼータフロアブル(普)	プロピリスルフロン	1.7	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ'カ、クロク'ワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効
	ベンゾビシクロン	3.9	
ボデーガードプロ1キロ粒剤 ノカウンシルコンプリート1キロ粒剤(普)	テフリルトリオン	3	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、クロク'ワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	トリアファモン	0.5	
ボデーガードプロジャンボ ノカウンシルコンプリートジャンボ(普)	テフリルトリオン	10	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、クロク'ワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効
	トリアファモン	1.6	
ボデーガードプロフロアブル ノカウンシルコンプリートフロアブル(普)	テフリルトリオン	5.8	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、オモダ'カ、ヒルムシロ、セリ、クロク'ワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	トリアファモン	0.97	
マサカリLジャンボ(普)	インダノファン	2.8	①1年生雑草及びマツバ'イ、ホタルイ、ウリカワ、ミズ'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミド'ロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効
	クロメブロップ	7	
	ペンスルフロンメチル	1	

ヤイバ1キロ粒剤(普)	ピリミスルファン	0.5	①1年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、コウキヤガラ、アオトドロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能
	フェントラザミド	3	
流星1キロ粒剤(普)	フェンキノトリオン	3	①1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ ②無人航空機による散布も可能
	ペントキサゾン	2.5	
	メタゾスルフロン	1	
流星ジャンボ(普)	フェンキノトリオン	7.5	①1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ ②浅植えの圃場には使用しない
	ペントキサゾン	6.25	
	メタゾスルフロン	2	
流星フロアブル(普)	フェンキノトリオン	6	①1年生雑草、マツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、クログワイ、、ヒルムシロ、セリ、コウキヤガラ ②無人航空機による散布も可能
	ペントキサゾン	5	
	メタゾスルフロン	1.7	
ルンバ楽粒(普)	オキサジクロメホン	2.4	①1年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人航空機による散布も可能 ④通常の湛水散布、湛水周縁散布のほか、水口施用、無人航空機による散布、水田の畦畔一辺からの散布等が可能
	プロモブチド	36.0	
	フロルピラウキシフェンベンジル	1.8	
レオゼータジャンボ(普) 【他の剤型】 1キロ粒剤、フロアブル剤	フェンキノトリオン	10.0	①1年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ウリカワ、ミスガヤツリ、オモダカ、ヒルムシロ、セリ、クログワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効
	プロピリスルフロン	3.0	
	プロモブチド	30.0	

(3)中後期剤

薬 剤 名			留意事項
アトカラSジャンボMX／セカンドショットSジャンボMX(普)	アジムスルフロン	0.36	①1年生雑草及びマツハ ^イ 、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ ^カ 、クログワイ、コウキヤガラ ②SU抵抗性雑草にも有効
	ペノキスラム	0.36	
	メソトリオン	2	
ウィードコア1キロ粒剤(普) 【他の剤型】 200SD粒剤、ジャンボSD	フロルピラウキシフェンベンジル	0.4	①1年生雑草及び多年生広葉雑草、キョウシュウスズメノヒエ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリ散布可
	ペノキスラム	0.5	
	ベンゾビスクロン	2	
クリンチャー1キロ粒剤(普)	シハロホップブチル	1.8	①ノビエ、キョウシュウスズメノヒエ、アゼガヤ ②広葉雑草には効果なし ③雑草の茎葉部から吸収されるため深水中に湛水して散布する ④無人ヘリ散布可
クリンチャーEW(普)	シハロホップブチル	30	①ノビエ、キョウシュウスズメノヒエ、アゼガヤ ②湛水又は落水状態で散布する ③湛水条件で散布する場合は散布液を使用当日に調製し、水の出入りを止めて湛水のまま均一に茎葉散布する ④落水条件で散布する場合は、撒きむらがないように均一に散布する ⑤広葉雑草には効果なし ⑥展着剤を加用すること ⑦無人航空機による散布も可能
クリンチャージャンボ(普)	シハロホップブチル	1.8	①ノビエ専用剤 ②広葉雑草には効果なし ③雑草の茎葉部から吸収されるため深水中に湛水して散布する
クリンチャーバスME液剤(普)	シハロホップブチル ペンタゾン	3 20	①1年生雑草及びマツハ ^イ 、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、オモダ ^カ 、クログワイ、コウキヤガラ、キョウシュウスズメノヒエ ②落水散布又はごく浅く落水して茎葉散布し、3日間(浅水処理は5日)入水しない ③展着剤は加用しない ④SU抵抗性雑草にも有効 ⑤オモダ ^カ は草丈5～15cmまで、クログワイは草丈10～20cm、コウキヤガラは発生盛期までに散布する ⑥高温時の散布は多めの希釈水量で散布する。(薬害)
テッケン1キロ粒剤 ／ニトウリュウ1キロ粒剤(普)	ペノキスラム ベンゾビスクロン	0.5	①1年生雑草及びマツハ ^イ 、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ ^カ 、クログワイ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③ホタルイ・コナギ・ミスガヤツリは4葉期まで、ウリカワは5葉期まで、オモダ ^カ は草丈30cmまでに、クログワイは草丈20cmまでに処理する ④無人航空機による散布も可能
		2	
トドメMF1キロ粒剤(普)	メタミホップ	1.35	①ノビエ専用剤 ②広葉雑草には効果なし ③湛水または落水して散布する ④2週間程度の土壌処理効果あり ⑤無人航空機による散布も可能
トドメMF乳剤(普)	メタミホップ	4.9	①ノビエ専用剤 ②広葉雑草には効果なし ③湛水または落水して散布する ④2週間程度の土壌処理効果あり
ハイクット1キロ粒剤(普)	シハロホップブチル	1.8	①1年生雑草及びマツハ ^イ 、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダ ^カ 、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリ散布可 ④ホタルイ・ミスガヤツリは4葉期まで、オモダ ^カ は矢尻葉3葉期まで、クログワイ・コウキヤガラは草丈30cmまでに処理する
	ジメタメトリン	1	
	ハロスルフロンメチル	0.9	
	ベンゾビスクロン	2	
バサグラン・エアー1キロ粒剤(普)	ペンタゾン	33.0	①1年生雑草(イネ科を除く)マツハ ^イ 、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヘラオモダ ^カ 、クログワイ、オモダ ^カ ②落水又はごく浅く湛水して散布し、3日間は落水状態を保つ。 ③ホタルイ、ヘラオモダ ^カ 、ミスガヤツリ、ウリカワでは、発生盛期から増殖中期まで、オモダ ^カ では発生盛期から発生揃期まで、クログワイでは草丈15cm～20cmまでが散布適期 ④SU抵抗性雑草にも有効 ⑤無人航空機による散布も可能 ⑥直播水稻にも可能
バサグラン液剤(普)	ペンタゾン	40	①1年生雑草(イネ科を除く)マツハ ^イ 、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヘラオモダ ^カ 、オモダ ^カ 、クログワイ、コウキヤガラ ②落水又はごく浅く湛水して散布し、3日間は落水状態を保つ。 ③クログワイは移植後15～50日(草丈15～30cm)、コウキヤガラは移植後25～45日(増殖期)に処理する。 ④SU抵抗性雑草にも有効
バサグラン粒剤(普)	ペンタゾン	11	①1年生雑草(イネ科を除く)マツハ ^イ 、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヘラオモダ ^カ 、オモダ ^カ ②落水又はごく浅く湛水して散布し、3日間は落水状態を保つ。 ③SU抵抗性雑草にも有効 ④散布適期はホタルイ・ミスガヤツリ発生盛期～増殖中期、オモダ ^カ 発生盛期～発生揃、クログワイは草丈15cm以下
レブラス1キロ粒剤(普)	ジメタメトリン	1	①1年生雑草及びマツハ ^イ 、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、オモダ ^カ 、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③ホタルイは花茎20cmまで、ミスガヤツリは4葉期まで、クログワイ・オモダ ^カ は草丈30cmまでに処理する ④無人航空機による散布も可能
	ダイムロン	10	
	テフリルトリオン	3	
	メタゾスルフロン	1.2	
レブラスジャンボ(普)	ジメタメトリン	2.5	①一年生雑草及び多年生広葉雑草 ②SU抵抗性雑草にも有効
	ダイムロン	25	
	テフリルトリオン	7.5	
	メタゾスルフロン	3	
ワイドアタックSC(普)	ペノキスラム	3.6	①1年生雑草及びマツハ ^イ 、ホタルイ、ウリカワ、セリ、ヒルムシロ、ミスガヤツリ、クログワイ、コウキヤガラ ②落水又はごく浅く湛水して茎葉散布する その後2日間(湛水散布は3日間)はそのままの状態を保つ ③展着剤は加用しない ④SU抵抗性雑草にも有効 ⑤稲出穂期の散布は薬害の恐れがあるので控える ⑥ホタルイは花茎抽出期まで、ミスガヤツリは4～6葉期まで、クログワイ・オモダ ^カ は草丈20～30cmまで、コウキヤガラは草丈20cmまでに処理する

ツイゲキ豆つぶ250(普)	シメトリン	12	①1年生雑草及びマツバイ、ホタルイ、ウリカワ、ミズガヤツリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、ヒルムシロ、セリ ②異常高温の時、あるいは散布後数日内に梅雨明けになるなど異常高温が予想される時は使用をさける ③無人へり散布可
	ピリミスルファン	3	
	フェンキノトリオン	10	
トドメバスMF液剤(普)	ベンタゾン	18.3	①1年生雑草および多年生雑草 ②乾燥が続いた条件では、除草効果が低下する場合がある
	メタミホップ	1.2	
ロイヤント乳剤(普)	フロルピラウキシフェンベンジル	2.7	①1年生雑草およびノビエ、マツバイ、ミズガヤツリ、ウリカワ、セリ ②土壌水分が少ないと効果が十分に発揮されないことがあるため、乾田または落水状態で散布した場合は、早めに入水する

4. 直播水稻

薬 剤 名			留意事項
ウィンングランジャンボ(普)	イブフェンカルバゾン	5	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ヘラオモダカ、ミスガヤツリ、ウリカワ、オモダカ、クログワイ、シズイ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層剥離 ②1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ミスガヤツリ、ウリカワ、セリ
	プロモブチド	18	
	ベンスルフロンメチル	1.5	
ウィンングランフロアブル(普)	イブフェンカルバゾン	5	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、オモダカ、クログワイ、コウキヤガラ、アオミドロ・藻類による表層はく離 ②アオミドロ、表層剥離は発生前まで、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリは2葉期までに処理する ③無人航空機による散布も可能
	プロモブチド	18	
	ベンスルフロンメチル	1.4	
オサキニ1キロ粒剤(直播)(普)	イマゾスルフロン	0.9	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ ②播種同時散布可能 ③無人ヘリ散布可 ④SU抵抗性雑草にも有効
	ピリミノバックメチル	0.6	
	プロモブチド	9	
キックバイ1キロ粒剤(直播)(普)	イマゾスルフロン	0.9	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ ②無人ヘリ散布可
	エトベンザニド	15	
	ダイムロン	15	
クリンチャーEW(普)	シハロホップブチル	30	①一年生イネ科雑草 ②雑草茎葉散布又は全面散布 ③広葉雑草には効果なし ④展着剤を加用すること ⑤無人航空機による散布も可能
クリンチャーパスME液剤(普)	シハロホップブチル	3.0	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヘラオモダカ ②乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布
	ペンタゾン	20.0	
サンバード粒剤(直播)(普)	ピラゾレート	10	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ヘラオモダカ ②中後期剤との体系で使用 ③播種同時散布可能 ④無人ヘリ散布可
サターンパアロ乳剤(普)	プロメトリン	5.0	①1年生雑草及びマツハイ ②乾田・落水状態で全面散布
	ベンチオカーブ	50.0	
スタム乳剤35(普)	プロパニル	35	①一年生雑草 ②乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布 ③耐雨性に優れ、効果発現は早い。
トップガンGT1キロ粒剤51(直播)(普)	ピリミノバックメチル	0.45	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、セリ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③深水条件で葉鞘褐変、流れ葉が出ることもあるので、水管理に注意する。
	プロモブチド	9	
	ベンスルフロンメチル	0.51	
	ペントキサゾン	2	
トップガンL250グラム(直播)(普)	ピリミノバックメチル	1.8	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③深水条件で葉鞘褐変、流れ葉が出ることもあるので、水管理に注意する ④周縁散布、無人ヘリ散布可
	プロモブチド	36	
	ベンスルフロンメチル	2	
	ペントキサゾン	8	
トップガンLジャンボ(直播)(普)	ピリミノバックメチル	1.8	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③深水条件で葉鞘褐変、流れ葉が出ることもあるので、水管理に注意する
	プロモブチド	36	
	ベンスルフロンメチル	2	
	ペントキサゾン	8	
トップガンLフロアブル(直播)(普)	ピリミノバックメチル	0.56	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、セリ、アオミドロ・藻類による表層はく離 ②SU抵抗性雑草にも有効 ③深水条件で葉鞘褐変、流れ葉が出ることもあるので、水管理に注意する
	プロモブチド	17	
	ベンスルフロンメチル	0.93	
	ペントキサゾン	2.8	
トドメMF乳剤(普)	メタミホップ	4.9	①ノビエ、オオクサギビ ②広葉雑草には効果なし ③雑草茎葉散布又は全面散布 ④直播水稻に使用する場合は、葉害をさけるため播種後10日以降・稲の3.5葉期以降に使用
トドメパスMF液剤(普)	ペンタゾン	18.3	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヘラオモダカ ②乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布 ③直播水稻に使用する場合は、葉害をさけるため播種後10日以降に使用 ④乾田直播水稻に使用する場合は、以下の点に特に注意すること。 1)重複散布をさけること。 2)軟弱徒長苗での使用はさけること。 3)高温期または高温が予想されるときは使用をさけること。 ⑤乾燥が続いた条件では除草効果が低下する場合があるので注意すること。特に乾田直播水稻に使用する場合は注意すること。
	メタミホップ	1.2	
トレファノサイド乳剤(普)	トリフルラリン	44.5	①ノビエ ②乾田状態で全面散布
ノミニー液剤	ビスピリバックナトリウム塩	2	①1年生雑草及びクサネム、イホクサ ②乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布 ③入水前処理
ハイカット1キロ粒剤(直播) /サンバンチ1キロ粒剤(直播)(普)	シハロホップブチル	1.8	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリ散布可
	ジメタメトリン	1	
	ハロスルフロンメチル	0.9	
	ベンゾビシクロン	2	
ブライオリティ1キロ粒剤(直播)(普)	トリアファモン	0.5	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミスガヤツリ、ヒルムシロ、セリ、ヘラオモダカ
	フェンキノトリオン	3	

ブライオリティ豆つぶ250(直播)(普)	トリアファモン フェンキノトリオン	2 12	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ、セリ ②無人航空機による散布も可能
ブレキープ1キロ粒剤(直播)(普)	ピラゾキシフェン ベンゾピシクロン	10 2	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリ散布可
ブレキープフロアブル(直播)(普)	ピラゾキシフェン ベンゾピシクロン	20 4	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヒルムシロ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリ散布可
マーシェット乳剤(直播)(普)	ブタクロール	32	①水田一年生雑草 ②乾田状態で使用する。播種後に湿潤状態が続くと苗立不良のおそれがあるので使用しない。 ③葉害のおそれがあるので、は種後の覆土が極端に浅い条件で使用しない。
ミスターホームランLフロアブル(直播)(普)	オキサジクロメホン クロメプロップ ベンスルフロンメチル	1.2 7 1	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、セリ ②SU抵抗性雑草にも有効 ③無人ヘリ散布可
ロイヤント乳剤(普)	フロルピラウキシフェンベンジル	2.7	①1年生雑草およびノビエ、ミス'ガヤツリ、ウリカワ、セリ ②乾田・落水状態で雑草茎葉散布又は全面散布
ワイドアタックSC(直播)(普)	ペノキスラム	3.6	①1年生雑草及びマツハイ、ホタルイ、ウリカワ、ミス'ガヤツリ、ヘラオモタカ、ヒルムシロ、セリ ②落水又はごく浅く湛水して茎葉散布する。その後2日間(湛水散布は3日間)はそのま まの状態を保つ。 ③展着剤は加用しない。 ④SU抵抗性雑草にも有効 ⑤稲出穂期の散布は葉害の恐れがあるので控える。 ⑥無人航空機による散布(ノビエ対象)も可能